

Avertissements[®]

agricoles Lorraine

Bulletin n° 8 du 05 avril 1989

Numérotation continue : n° 89

Grandes cultures

COLZA :

- . Mèligèthes : fin des traitements
- . Sclérotinia : intervenir au bon moment
- . Attention aux abeilles
- . Stratégie de lutte - liste des produits

CEREALES : Attendre

COLZA :

Les colzas atteignent le stade boutons écartés à début floraison.

- Mèligèthes :

Les conditions météorologiques fraîches et pluvieuses actuelles ne sont pas favorables au développement des mèligèthes.

N'intervenir que si le seuil de 2-3 mèligèthes par pied en moyenne est atteint et si aucun traitement contre cet insecte n'a été réalisé antérieurement.

N.B. : Toute intervention contre les mèligèthes devient totalement inutile à l'apparition des premières fleurs.

- Sclérotinia :

Dans les zones précoces, apparaissent les premières fleurs de colza.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST SOUMISE A NOTRE AUTORISATION

Imprimerie de la Station de NANCY
 Directeur-Gérant : D. VERBEKE
 Publication Périodique
 CPPAP N° : 2011 AD
 Abonnement annuel :

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
 SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

38, rue Sainte-Catherine
 54043 NANCY CEDEX
 Tél. 83 30 41 51



P 154

A la chute des premiers pétales (stade F1-G1), réaliser un traitement fongicide.

Si les colzas ont dépassé le stade F1-G1, préférer une spécialité à action légèrement curative : SUMISCLEX, RONILAN ou produits à base d'iprodione.

Tenez compte de la présence de cylindrosporiose dans votre parcelle pour le choix des produits (voir tableau des produits ci-joint).

**PENDANT LA FLORAISON, N'UTILISEZ QUE DES PRODUITS
BENEFICIAINT DE LA MENTION
"EMPLOI AUTORISE DURANT LA FLORAISON..."**

Remarque : Sur d'anciens produits, cette mention peut être libellée de façon similaire, à savoir : "PRODUIT NON DANGEREUX POUR LES ABEILLES".

- Rappel :

Les mélanges fongicide + insecticide sont à éviter car techniquement mal justifiés.

CEREALES :

Dans les zones précoces, les orges et les blés atteignent le stade 1 noeud.


L'état sanitaire des céréales est très satisfaisant.

Attendre un prochain avis pour intervenir.



MALADIES DU COLZA AU PRINTEMPS

trois périodes clefs



les produits que vous pouvez utiliser

Matières actives	Spécialités commerciales*	Cylindrosporirose	Pseudocercos. capsellae	Sclerotinia	Alternaria
carbendazime	Nombreuses	500 g m.a. (B)		500 g m.a. (TB)	
iprodione	Rovral Kidan			3 l (TB)	1 kg 2 l (B TB)
prochloraz	P2 450 Sportak 45	1,33 l (B)			
procymidone	Sumisclex Sumisclex liquide			1,5 kg 1 l (TB)	1,5 l (B)
vinchlozoline	Ronilan FI Ronilan			1,5 l 1,5 kg (TB)	
carbendazime + prochloraz	Sportak PF	1,5 l (B)	1,5 l (TB)	1,5 l (B)	
iprodione - carbendazime	Calidan	3 l (B)		3 l (B)	
prochloraz + mancozebe	Sportak MZ Sportak MZ2	1 l - 3,5 l (B)			
vinchlozoline - carbendazime	Konker			1,5 l (B)	
flusilazole - carbendazime	Punch C	0,8 l (TB)	0,8 l (TB)	0,8 l (B)	
flutriafol - carbendazime	Impact R Impact RM	1,25 l 1 l (B)	1,25 l 1 l (TB)	1,25 l 1 l (B)	1 l (M)
manébe - thiophanate méthyl	Peltar Peltarflo	3 kg (M)		3 kg 5 l (B)	

* Doses de produit commercial à l'hectare.

Très Bon (TB)

Bon (B)

Moyen (M)

Liste arrêtée au 15 mars 1989

7152

